



# VACCINATION DES TOUT-PETITS

En Belgique, la vaccination contre la poliomyélite (polio) est obligatoire, d'autres vaccins sont fortement recommandés.

Le vaccin de la polio est gratuit, se fait en 4 doses :

-  2 mois,
-  3 mois,
-  4 mois et
-  15 mois de l'enfant.

Une fois le schéma de vaccination de la polio complet et réalisé, les parents doivent obligatoirement transmettre une attestation originale de vaccination juste après la dernière injection

Cette attestation doit comprendre :

- l'identité de l'enfant,
- les dates des 4 doses (ainsi que le nom du vaccin),
- la signature et le cachet du médecin.

Vous devez la déposer au service population de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean (rue Sainte-Marie 25 ou rue Charles Malis 40 du lundi au vendredi de 8h à 12h sans rendez-vous).

La vaccination est une mesure pour tout le monde et est indispensable dans des lieux où plusieurs enfants sont accueillis ensemble et peuvent transmettre ou contracter une maladie.

Pour fréquenter un milieu d'accueil francophone, l'enfant doit être vacciné selon l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant sur la réglementation générale des milieux d'accueil dans un souci de protection de la collectivité.

Les vaccins obligatoires pour fréquenter un groupe d'enfants de moins de trois ans sont ceux contre :

-  la poliomyélite,
-  la diphtérie,
-  le tétanos,
-  l'hépatite B
-  la coqueluche,
-  la méningite (à Haemophilus influenzae b),
-  la rougeole,
-  la rubéole,
-  les oreillons,
-  les pneumocoques
-  le Rotavirus

Pour vacciner votre enfant, vous pouvez téléphoner pour prendre rendez-vous dans un centre de consultation :

- ONE (contact 02 432 88 55)
- Kind & Gezin (contact 078 150 100)

Le service de la Petite Enfance se fera un plaisir de vous aider au 02 412 36 92



# CALENDRIER DE VACCINATION

## 2023-2024

Nourrissons		Enfants et adolescents			Adultes	
8 sem. (2 mois)	12 sem. (3 mois)	12 mois	15 mois	15-16 ans	Femmes enceintes	65 ans
12 sem. (3 mois)	16 sem. (4 mois)	5-6 ans	7-8 ans	13-14 ans	Tous les 10 ans	

	8 sem. (2 mois)	12 sem. (3 mois)	16 sem. (4 mois)	12 mois	15 mois	5-6 ans	7-8 ans	13-14 ans	15-16 ans	Adultes
Poliomyélite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diphtérie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tétanos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coqueluche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Haemophilus influenzae</i> de type b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hépatite B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rougeole	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rubéole	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oreillons	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Méningocoques ACWY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pneumocoques	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotavirus (vaccin oral)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papillomavirus (HPV)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grippe (Influenza)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Recommandé à tous et gratuit



Recommandé à tous



Vaccin combiné (une seule injection)



- Pour les bébés nés avant 37 semaines de grossesse, une dose supplémentaire de vaccin contre le pneumocoque est recommandée à 3 mois et les vaccins prévus à 15 mois seront administrés à 13 mois (hexavalent et méningocoques ACWY).
- Depuis septembre 2020, la deuxième dose du vaccin RRO est administrée à 7-8 ans. Les enfants plus âgés qui n'ont pas encore reçu la vaccination peuvent être vaccinés à 11-12 ans.
- En 2 ou 3 doses en fonction du vaccin administré.
- Vaccination en 2 doses à 6 mois d'intervalle (minimum 5 mois d'écart).
- À partir de 24 semaines et idéalement avant 32 semaines de grossesse.
- Pendant la saison grippale, quel que soit le stade de la grossesse.

Ce calendrier est susceptible d'être modifié au fil des ans. Votre médecin pourra éventuellement l'adapter à votre enfant, n'hésitez pas à discuter vaccination avec lui.

Pour plus d'infos :  
Consultez votre médecin  
traitant ou le site  
[www.vaccination-info.be](http://www.vaccination-info.be)

